

بسم تعالی

شماره: ۱۴۰۱-۲-۴۰۰/۶۱۲۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

پیوست: دارد

سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
تجربه بهداشت و درمان شهرداری

جناب آقای دکتر عبدالقیوم بفقین
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی

با سلام و احترام،

به پیوست نامه معاون محترم بهداشتی دانشگاه به شماره ۵۰۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ منضم به نامه رئیس محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت متبوع به شماره ۳۰۴/۷۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ و نامه معاون محترم بهداشت وزارت متبوع به شماره ۲۳۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ درخصوص واکسیناسیون کووید ویژه مادران باردار جهت استحضار و دستور اطلاع رسانی به کلیه متخصصین زنان و پزشکان و ماماهاى بخش خصوص ارسال می شود.

دکتر محمد هادی ناصح
مدیر شبکه



"قدمی به جلو برای تغذیه با شیر مادر؛ حمایت و

آموزش"

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهریار، قدس، ملارد، رباط کریم و بهارستان


رئیس محترم مرکز بهداشت غرب و شمال غرب

موضوع: واکسیناسیون مادر باردار علیه بیماری کووید ۱۹

با سلام و احترام،

به پیوست نامه شماره ۳۰۲/۱۰۱۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ مدیر کل محترم دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس منضم به نامه شماره ۳۰۴/۷۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ رئیس محترم وقت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت متبوع در خصوص واکسیناسیون مادران باردار علیه بیماری کووید ۱۹ جهت استحضار ارسال می شود.


دکتر محمد میرزائی
معاون فنی معاونت بهداشت



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۲/۱۰۱۴۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: واکسیناسیون مادر باردار علیه بیماری کووید ۱۹

با سلام و احترام

با توجه به پرسشهای مکرر همکاران در خصوص واکسیناسیون ضد بیماری کووید ۱۹ در مادران باردار به پیوست نامه شماره ۳۰۴/۷۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ رئیس محترم وقت مرکز مدیریت بیماری های واگیر ارسال می گردد.

لازم به ذکر است برای تزریق دوز یادآور واکسن ضد بیماری کووید ۱۹، مطابق دستور عمل های کشوری اقدام گردد و تنها واکسن مجاز به تزریق در دوران بارداری واکسن سینوفارم می باشد.

دکتر محمدرضا صائینی
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس

شماره: ۳۰۰/۲۳۳۰۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

پوست ندارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



معاونت بهداشت

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...


موضوع: به روز رسانی واکسیناسیون خانم های باردار و شیرده علیه کووید-۱۹

با سلام و احترام

ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق جهت تقویت واکسیناسیون مادران باردار نامه شماره ۳۰۰/۲۳۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و کمیته ملی واکسن کووید-۱۹ و کمیته کشوری سلامت مادران، موارد ذیل در خصوص واکسیناسیون کووید-۱۹ در دوران بارداری و شیردهی اعلام می شوند:

- در خانم های باردار با سن زیر ۱۸ سال از شروع بارداری تا هفته ۳۹ بارداری، واکسن سینوفارم قابل توصیه است.
- تزریق واکسن آسترانکا به عنوان دز اول در بارداری توصیه نمی شود و صرفا در صورت اصرار مادر باردار و یا شرایطی خاص (مانند مسافرتین خارج کشور)، در صورت تایید کمیته دانشگاهی و پس از اخذ رضایت کتبی، از سن ۱۸ سال به بالا و از شروع بارداری تا هفته ۳۹ بارداری قابل انجام است.
- در دوران پس از زایمان توصیه می شود واکسیناسیون تا ۱۵-۱۰ روز پس از زایمان (مراقبت دوم) به تعویق افتد.
- در دوران شیردهی، واکسیناسیون از روز دهم تا پانزدهم پس از زایمان (مراقبت دوم) با یکی از دو واکسن بهارات بیوتک (در سن بالای ۱۸ سال) و یا سینوفارم (تمامی مادران زایمان کرده در همه گروه های سنی) قابل انجام است.
- واکسیناسیون دوز بوستر، در مادران باردار و پس از زایمان و دوران شیردهی، مطابق دستورعمل های ابلاغی جهت جمعیت عمومی، ولی با واکسن های مجاز در این دوران خواهد بود.
- خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به کلیه مراکز تحت پوشش آن معاونت محترم ابلاغ شود.

دکتر کمال حیدری
معاون بهداشت



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۲/۷۰۸۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری

جناب آقای دکتر گویا

رئیس محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

موضوع: به پیوست استعلام دوز یادآور واکسیناسیون کرونا برای مادران باردار

با سلام و احترام

پیرو ابلاغ مصوبات یکصد و هجدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تزریق دوز یادآور واکسن کرونا، خواهشمند است در خصوص واکسیناسیون مادران باردار نظرات ارشادی را به این دفتر اعلام بفرمائید:

• واکسن مناسب برای مادران باردار کدام نوع است؟ (با توجه به نوع واکسنهای تزریق شده در دوزهای قبل)


• حداقل و حداکثر فاصله زمانی بین دوز اول، دوم، سوم و چهارم چقدر باشد؟

• در صورت تزریق دوز اول واکسن و گذشت ۵ ماه، آیا دوز دوم تزریق شود یا دوز اول در نظر گرفته شود؟

• آیا امکان اجباری نمودن واکسیناسیون در بارداری می باشد؟

به پیوست استعلام دانشگاه علوم پزشکی مشهد با نامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۴۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ حضورتان ارسال می گردد.

دکتر محمدرضا صائینی
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۷۵۰۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

پوسته: ندارد

تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین
مقام معظم رهبری

جناب آقای دکتر محمدرضا صائینی

مدیرکل محترم دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

موضوع: واکسیناسیون کرونا برای مادران باردار

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه شماره ۳۰۲/۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ در خصوص واکسیناسیون کووید-۱۹ در بارداری، ضمن ارسال مجدد نامه شماره ۳۰۰/۲۳۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴، پاسخ سوالات به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

- واکسن مناسب در دوره بارداری، سینوفارم است.
- حداقل فاصله دز اول و دوم، ۲۱ روز است.
- در حال حاضر نوبت یادآور به افراد بالای ۱۸ سال توصیه می‌شود لذا افرادی که حداقل ۶ ماه از نوبت قبل گذشته، توصیه به دریافت نوبت یادآور (سوم یا چهارم) می‌شوند.
- برای واکسن های کووید-۱۹ حداکثر فاصله تعیین نشده و توصیه عمومی، تزریق واکسن در فواصل تعیین شده در دستورالعمل های کشوری است.
- در صورت گذشت ۵ ماه از دز اول، نیازی به شروع ایمن سازی از ابتدا نمی باشد.
- در حال حاضر اجباری شدن واکسیناسیون کووید-۱۹ در هیچ یک از گروه های جمعیتی جزو سیاست های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا نمی باشد و صرفا با آموزش و اطلاع رسانی نسبت به ترغیب آحاد جامعه به واکسیناسیون اقدام می شود.

دکتر محمد مهدی گویا
ریس مرکز مدیریت بیماری های واگیر