

بسمتعالی

شماره: ۱۴۰۱-۲-۴۰۰/۹۲۲۴

شماره پیوسته: ۱۴۰۱/۱۰/۹/۲۹

تاریخ پیوست: دارد

پیوست:

سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین




دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی ایران
مجلس بهداشت و درمان شهرداری

جناب آقای دکتر عبدالقیوم بفقین

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان شهریار

با سلام و احترام،

با عنایت به بند ۱۱ مصوبات کمیته شهرستانی نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه مورخ ۱۴۰۱/۶/۷، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص ممنوعیت تجویز و تزریق آمپول سفتریاکسون و کورتون به کودکان در مطب، به پزشکان بخش خصوصی اطلاع رسانی گردد. بخشنامه سفتریاکسون به پیوست ارسال می شود.



دکتر محمد هادی ناصح
مدیر شبکه

ارزانی ۱۴
سازمان نظام پزشکی شهرستان شهریار
شماره: ۱۴۰۱/۱۰/۶/۲۹
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

بسمه تعالی



شماره: ۱۶۶۸۸
تاریخ: ۱۳۸۳/۰۸/۰۸
پرست: ...
گواهی‌نامه اعتباری شماره: ...

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز کشور
موضوع: معرفی فشکوک به مصرف سفتریاکسون

سلام علیکم:

با احترام، با توجه به ثبت ۲۶ مورد فشکوک به مصرف سفتریاکسون طی سال‌های ۱۳۷۷ تاکنون
شهرنورماه ۱۳۹۰ در مرکز ADR ایران و با توجه به گزارش موارد متعددی از عوارض شدید و تهدیدکننده حیات ناشی
از مصرف این دارو، لذا دستور فرمایید به‌منظور پیوست به نحو مقتضی و در اسرع وقت به اطلاع کمیته آفراد شاغل در
حرف پزشکی در کلیه مراکز دولتی و خصوصی تهیه اعم از شبکه های بهداشتی - درمانی، مطب، داروخانه، مراکز
بیمارستان ها و داروخانه ها رسانیده شود.

دکتر احمد شهبازی
معاون رئیس مرکز آذربایجان

دکتر سید حسن امینی
معاون درمان

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، طبقه ۱۳
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
وبسایت: www.moh.gov.ir
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، طبقه ۱۳
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
وبسایت: www.moh.gov.ir

بخشنامه سفتری اکسون

با توجه به ثبت 71 مورد مرگ مشکوک یا مصروف سفتری اکسون طی سالهای 1377 الی شهریور 1390 در مرکز ADR ایران، و نظر به اینکه این فرآورده بیشترین تعداد مصروف (2388 مورد از 28251 مورد بیمار دچار عارضه به ثبت رسیده در مرکز ADR ایران) و نیز بیشترین تعداد موارد مرگ مرتبط با مصروف فاروآرا در بانک اطلاعاتی مصروف به ثبت رسیده در مرکز ADR ایران به خود اختصاص می دهد رعایت موارد زیر توسط کلیه نمایندگان حرف پزشکی در تمامی مراکز درمانی دولتی و خصوصی الزامی است. بدیهی است عدم رعایت موارد زیر، پیگرد قانونی خواهد داشت و بواسطه قانون برخورد خواهد شد.

1- از تجویز و مصرف سفتری اکسون در مواردی مانند سرماخوردگی و سایر مصروفی که از جمله مصروف مصروف تایید شده این فرآورده نیست، جدا خودداری شود.

2- از تجویز سریع و دیدی سفتری اکسون جدا خودداری شده. انفریزین و دیدی در مقبول مناسب حداقل 15 الی 30 دقیقه به طول انجامد.

3- پیش از تجویز یا تزریق سفتری اکسون حتماً بر مبنای سابقه حساسیت دارویی بیمار نسبت به سفتری اکسون یا سایر سفتراسپورین ها (مانند سفالکسین، تریفلوکسین، سفیکسیم، سفترایم، سفازولین و ...) یا پنی سیلین ها، از بیمار سؤال شود. مصرف سفتری اکسون در افرادان با سابقه حساسیت به سفتری اکسون یا سایر سفتراسپورین ها ممنوع می باشد. همچنین با توجه به حساسیت متقاطع پنی سیلین ها و سفتراسپورین ها، در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها نیز تجویز این فرآورده فقط در مواقع بسیار ضروری و با احتیاط فراوان صورت پذیرد.

4- تزریق سفتری اکسون باید صرفاً توسط افراد مجرب در مراکز مجهز به سیستم آمیبا انجام گیرد. از تزریق توسط افراد غیرمجهز ای یا در مکانهای غیر از مراکز درمانی مجرب به امکانات آمیبا جداً خودداری شود.

5- مصرف همزمان سفتری اکسون با مپروما یا فرآورده های حاوی کلیمید در کودکان حتی به صورت انفریزین از رگهای متفاوت ممنوع می باشد.

6- بخشی از مکان از مصالح معمولی یا غیر آبرفته های حاوی کلسیم تا 48 ساعت پس از آخرین بورد
سفت‌ریختن در تمام گروه های سنی انجام گیرد.

7- مصرف سفت‌ریختن در نوزادان مبتلا به عفونت بیلی روبینیمیا، بویژه نوزادان نارس، ممنوع می باشد.
مطالعات نشان داده است که سفت‌ریختن فانی به جای جلیبیلی بیلی روبین از شکل اتصال به آلبرومین سرم
نی باشد و لذا امکان ایجاد انتقال‌پذیری ناشی از افزایش بیلی روبین در این بیماران مطرح می باشد.

8- استفاده از رقیق کننده های حاوی کلسیم، مانند محلول ویتکی، به منظور آماده سازی سفت‌ریختن جهت
تزیین ممنوع می باشد.

9- مسئولین نمی باروخانه ها باید از جدول جدول نسخه این فرآورده (همانند سایر داروهای تحت نسخه) جدا
خوانداری نمایند. بدین امید تحول بدون نسخه باروخانه توسط باروخانه دیگر قلمرو خواهد داشت و برپایه
لکون برخورد خواهد شد.