

CASE REPORT:

شماره یک:

کودک ۶ ماهه روز قبل از فوت از صبح دچار استفراغ شده است ۴-۳ بار استفراغ کرده و نمی توانسته چیزی بخورد و هر آنچه می خورده بالا می آورده. علائم دیگری نداشته والدین از داروخانه قطره ستوکلوپرامید می گیرند پس از مصرف دارو استفراغ کودک قطع می شود ولی از شب دچار اسهال می شود تا صبح ۱۰-۸ بار اجابت مزاج داشته است بسیار بی قرار بوده و تا صبح نخوابیده است حدود ساعت ۵-۴ صبح به درمانگاه شبانه روزی مراجعه می کنند در آنجا اظهار می کنند کودک زیر یکسال ویزیت نمی کنند و بدون معاینه کودک به پدر توصیه می کند داروی کیدی لاکت تهیه کند و توصیه دیگری نمی کند والدین کیدی لاکت تهیه می کنند یک بار از دارو به کودک می دهد ولی کودک بدتر می شود و ۴-۵ بار دیگر اسهال داشته تا صبح نخوابیده و بسیار بی قرار بوده و دچار تنگی نفس می شود و بی حال و بی هوش می شود با وسیله شخصی کودک را به بیمارستان می برند متأسفانه کودک به اقدامات درمانی پاسخ نمی دهد و فوت می کند.

مشکلات:

- عدم پذیرش کودک بدحال در درمانگاه شبانه روزی
- عدم اعزام کودک با اورژانس به بیمارستان توسط درمانگاه
- عدم آگاهی والدین در خصوص علائم خطر و زمان مراجعه فوری

شماره ۲:

کودک ۵۵ ماهه با سابقه تشنج و مشکلات مغزی که دیگر حملات تشنج نداشته است در سن ۵۵ ماهگی دچار تب، اسهال و استفراغ می شود که در حد ۲-۳ مرتبه دفع داشته به مطب پزشک مراجعه می کند پزشک دارو تجویز می کند و اظهار می کند کودک خوب می شود و توصیه ای در خصوص مراجعه به بیمارستان نمی کند. پس از مصرف داروهای تجویز شده تب و استفراغ و اسهال کنترل می شود دو روز خوب بوده است و علائمی نداشته است ولی مجدداً تب می کند مادر مجدداً به مطب دکتر جهت انجام تزریق داروهای قبلی مراجعه کرده که پزشک مجدداً کودک را ویزیت می کند و دارو تجویز می کند. پس از مصرف داروهای نسخه دوم ۳ روز خوب بوده است و علائمی نداشته است سپس کودک دچار اسهال خونی می شود یک مرتبه اسهال خونی داشته به مطب همان پزشک مراجعه می کند که توسط پزشک دیگری ویزیت می شود. پزشک دارو تجویز نمی کند کودک را به بیمارستان ارجاع می دهد چند ساعت در بیمارستان تحت نظر بوده است سپس به بیمارستان مجری اعزام می شود در راه کودک بدحال می شود و فوت می کند

- داروهای تجویز شده در مطب پزشک:
- آمپول دیازپام ۱ عدد
- سرم ۱/۳ ۲/۳ (دکستروز سالین) ۲ عدد
- آمپول سفارولین ۲ عدد

- آمپول دکزامتازون ۲ عدد
- آمپول اندانسترون ۲ عدد
- آمپول ب کمپلکس ۴ عدد
- شربت نشوزینک
- شربت لوپرامید
- شربت اندانسترون
- محلول خوراکی (one lyte)
- قطره پروبیوتیک Biolact
- سوسپانسیون ابیروپروفن
- شیفاف دیکلوفناک
- نسخه دوم
- سرم ۲/۳ ۱/۳ (دکستروز سالین) ۲ عدد
- آمپول سفازولین ۲ عدد
- آمپول ویتامین ب کمپلکس ۴ عدد
- ویال هیدروکورتیزون ۲ عدد
- مشکلات:
- عدم توجه پزشک به وخامت حال بیمار و ارجاع فوری
- عدم تشکیل پرونده برای کودک
- تجویز نادرست داروها توسط پزشک ب با توجه به سن و شرایط کودک

شماره ۳:

کودک ۶ ماهه دو روز قبل از فوت، دچار علائم سرماخوردگی شده است. آبریزش بینی، تب، اسهال و استفراغ داشته. تب را با نسی بدن (دعاسنج نداشته) متوجه شده ۴-۳ بار اسهال و دو مرتبه استفراغ داشته است. همان روز (شروع بیماری) نزد پزشک مراجعه می کند پزشک دارو تجویز می کند. پس از مصرف داروها علائم کنترل نمی شود روز بعد مجدداً به مطب همان پزشک مراجعه می کند پزشک دارویی تجویز نمی کند و به مادر می گوید داروها را ادامه دهد کودک بهبود می یابد و از مراجعه به بیمارستان چیزی نمی گوید مادر به مطب پزشکی دیگری مراجعه می کند، که دارو تجویز می کند و داروهای تجویز شده را مصرف می کند ۴-۳ ساعت بهتر بوده از ساعت ۳ شب کودک بسیار بی قراری می کرده اسهال ادامه داشته و صورتش داغ بوده، کودک بی حال بوده، کودک می خوابد پس از چند ساعت مادر بیدار می شود متوجه می شود کودک رنگ پریده است چشم هایش باز و خیره مانده و نفس نمی کشد فوراً به مطب پزشک می روند پزشک اظهار می کند کودک فوت شده. شایان ذکر است کودک ده ساعت پس از ویزیت پزشک دوم فوت کرده است.

داروهای تجویز شده توسط پزشک اول:

شربت سفکسیم - شربت اندانسترون - قطره پاراکتید - آمپول بتامتازون
پزشک دوم برای کودک پرونده تشکیل نداده است. داروهای تجویز شده توسط پزشک دوم:
آمپول اندانسترون - آمپول بتامتازون و شربت آرترومایسین

مشکلات: